



SENTRY (Сентрі) краплі від бліх, кліщів і комарів для собак

SENTRY®

Антипаразитарні краплі **TM SENTRY** містять піретроїди – інсектициди контактної дії, які вбивають бліх, кліщів та комарів безпосередньо при контакті, а не під час укусу. Піретроїди справляють на комах відлякуючий ефект.

Краплі **TM SENTRY** не тільки вбивають бліх, але і припиняють цикл їхнього розвитку за допомогою запатентованого регулятора росту комах (піріпроксифену), який ефективно знищує яйця і личинки бліх.

Активні інгредієнти: Перметрин – 45%, Піріпроксифен – 1,9%, решта інгредієнтів – 53,1%

Дістаньте піпетки з упаковки. Ножицями відріжте кінчик піпетки, направивши її у проти-лежний бік від обличчя. Утримуйте тварину однією рукою, другою рукою нанесіть розчин. Переверніть піпетку, вузьким кінцем розділіть шерсть і нанесіть вміст однієї піпетки на шкіру тварини у вигляді плями або лінії від основи голови до лопаток, для собак великих порід – до основи хвоста. Утримуйте тварину до повного всмоктування розчину.

Дозування для собак:

- для собак вагою до 7 кг піпетка 1 мл
- для собак вагою 7–15 кг піпетка 1,5 мл
- для собак вагою 15–30 кг піпетка 3 мл
- для собак вагою більше 30 кг піпетка 4,5 мл

Після завершення процедури загорніть піпетку в папір і викиньте.

Правила експлуатації. Не використовуйте продукт частіше одного разу на місяць. Про-дукт призначений тільки для собак та цуценят віком від 12 тижнів. Не застосовувати для кішок або інших тварин. Не купайте вихованця протягом 12 годин з моменту нане-сення крапель. Якщо у Вас є інші тварини, ізолюйте обробленого собаку і не дозволяйте іншим вилизувати його до остаточного висихання розчину.

Тільки для собак. Тільки для зовнішнього застосування. Не застосовувати для цуценят віком до 3-х місяців. Перед застосуванням даного продукту на ослаблених, старих, хво-рих, вагітних і годуючих тваринах проконсультуйтеся з ветеринаром. Тварина може мати підвищену чутливість до будь-якого продукту, що містить пестициди. Помітивши озна-ки прояву підвищеної чутливості, ретельно викупайте вихованця в теплій воді з милом. Якщо симптоми не зникнуть, проконсультуйтеся з ветеринаром. Симптоми чутливості до продукту можуть проявлятися у вигляді почервоніння шкіри, висипу, знебарвлення і ви-падання шерсті в місці нанесення препарату. Також у собак може відзначатися млявість. Деякі ліки не сумісні з інсектицидами. Перед застосуванням продукту на тварині, яка при-ймає медикаменти, проконсультуйтеся з ветеринаром.

Увага! Може викликати подразнення слизової оболонки очей середньої тяжкості. Уни-кайте контакту з очима та одягом. Уникайте потрапляння продукту в очі і пащу тварини. Після застосування крапель, перед їжею, питвом, курінням і т.д., ретельно вимийте руки водою з милом.

Перша допомога при попаданні в очі. Утримуйте очі у відкритому стані і промивайте водою протягом 15–20 хвилин. Якщо Ви носите контактні лінзи, зніміть їх у перші 5 хвилин і продовжуйте промивання. Зверніться до лікаря або в токсикологічний центр для подаль-шого лікування. Покажіть лікарю упаковку продукту.

Зберігання та утилізація. Діставайте піпетку з упаковки тільки безпосередньо перед за-стосуванням. Зберігайте в прохолодному (до 25°C) сухому місці, недоступному для дітей. Забороняється заморожувати. Не використовуйте та не зберігайте продукт у безпосе-редній близькості від опалювальних приладів і відкритого вогню. Не піддавайте впливу прямого сонячного світла.



SENTRY (Сентри) капли от блох, клещей и комаров для собак **SENTRY®**

Антипаразитарные капли **TM SENTRY** содержат пиретроиды – инсектициды контактного действия, которые убивают блох, клещей и комаров непосредственно при контакте, а не при укусе. Пиретроиды обладают отпугивающим насекомых эффектом.

Капли **TM SENTRY** не только убивают блох, но и прекращают цикл их развития с помощью запатентованного регулятора роста насекомых (пирипроксифена), который эффективно убивает яйца и личинки блох.

Активные ингредиенты: Перметрин – 45%, Пирипроксифен – 1,9%, остальные ингредиенты – 53,1%

Достаньте пипетки из упаковки. Ножницами отрежьте узкий конец пипетки, направив ее в противоположную сторону от лица. Удерживайте животное одной рукой, второй рукой нанесите раствор. Переверните пипетку, узким концом разделите шерсть и нанесите содержимое одной пипетки на кожу в виде пятна или линии от основания головы до лопаток, для собак крупных пород – до основания хвоста. Удерживайте животное до полного впитывания раствора.

Дозировка для собак:

- для собак весом до 7 кг пипетка 1 мл
- для собак весом 7–15 кг пипетка 1,5 мл
- для собак весом 15–30 кг пипетка 3 мл
- для собак весом более 30 кг пипетка 4,5 мл

После завершения процедуры заверните пипетку в бумагу и выбросьте.

Правила эксплуатации. Не используйте продукт чаще одного раза в месяц. Продукт предназначен только для собак и щенков старше 12 недель. Не применять для кошек или других животных. Не купайте питомца в течение 12 часов с момента использования капель. Если у Вас есть другие животные, изолируйте обработанную собаку и не разрешайте им вылизывать ее до окончательного высыхания раствора.

Только для собак. Только для наружного применения. Не применять для щенков младше 3-х месячного возраста. Перед использованием данного продукта на ослабленных, старых, больных, беременных и кормящих животных проконсультируйтесь с ветеринаром. Животное может обладать повышенной чувствительностью к любому продукту, содержащему пестициды. Заметив признаки проявления повышенной чувствительности, тщательно выкупайте питомца в теплой воде с мылом. Если симптомы не исчезнут, проконсультируйтесь с ветеринаром. Симптомы чувствительности к продукту могут проявляться в виде покраснения кожи, сыпи, обесцвечивания и выпадения шерсти в месте нанесения препарата. Также у собак может отмечаться вялость. Некоторые лекарства не совместимы с инсектицидами. Перед использованием продукта на животном, принимающем медикаменты, проконсультируйтесь с ветеринаром.

Внимание! Может вызвать раздражение слизистой глаз средней тяжести. Избегайте контакта с глазами и одеждой. Избегайте попадания продукта в глаза и рот животного. После использования капель, перед едой, питьем, курением и т.д., тщательно вымойте руки водой с мылом.

Первая помощь при попадании в глаза. Удерживайте глаза в открытом состоянии и промывайте водой в течение 15–20 минут. Если Вы носите контактные линзы, снимите их в первые 5 минут и продолжайте промывание. Обратитесь к врачу или в токсикологический центр для дальнейшего лечения. Покажите врачу упаковку продукта.

Хранение и утилизация. Доставайте пипетку из упаковки только непосредственно перед применением. Храните в прохладном (до 25°C) сухом месте, недоступном для детей. Не замораживайте. Не используйте и не храните продукт в непосредственной близости от отопительных приборов и открытого огня. Не подвергайте воздействию прямого солнечного света.